

MODALITÀ DI OFFERTA DELLA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA

La campagna vaccinale per l'anno 2012 prevede offerta attiva e gratuita:

1. ai soggetti appartenenti alle tre coorti di nascita dei **65enni**, dei **70enni** e dei **75enni**, e cioè dei soggetti nati rispettivamente nel 1947, nel 1942 e nel 1937;
2. a tutti i soggetti **over 75**;
3. ai **soggetti adulti di età compresa tra i 50 e i 74 anni di età** (ovvero i nati dal 1938 al 1962) a **rischio** di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza delle patologie o condizioni predisponenti:
 - cardiopatie croniche
 - malattie polmonari croniche
 - cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcoolismo
 - diabete mellito, in particolare se in difficile compenso
 - fistole liquorali
 - anemia falciforme e talassemia
 - immunodeficienze congenite o acquisite
 - asplenia anatomica o funzionale
 - leucemie, linfomi, mieloma multiplo
 - neoplasie diffuse
 - trapianto d'organo o di midollo
 - immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa
 - insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica
 - HIV positivi
 - portatori di impianto cocleare.

A tali soggetti dovrà essere somministrato il vaccino coniugato 13-valente (PCV13), secondo lo schema sotto riportato, avendo cura di classificarli nell'Allegato 3 nella categoria << **soggetto a rischio per la patologia** >>

L'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antipneumococcica dovrà avvenire secondo il seguente schema:

Età	Anno di nascita	Stato vaccinale	Vaccino da somministrare	Note
65enni	1947	<i>Non vaccinati</i>	<i>PCV 13</i>	
		<i>Già vaccinati con PPV 23 per patologia</i>	<i>PCV 13</i>	<i>Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23</i>
70enni	1942	<i>Non vaccinati</i>	<i>PCV 13</i>	
		<i>Già vaccinati con PPV 23</i>	<i>PCV 13</i>	<i>Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23</i>
75enni e oltre	1937 in poi	<i>Non vaccinati</i>	<i>PPV 23</i>	
		<i>Già vaccinati da 5 anni con PPV 23</i>	<i>PPV 23</i>	<i>Da utilizzare come richiamo</i>
50 -74 enni a rischio per patologia	dal 1938 al 1962	<i>Non vaccinati</i>	<i>PCV 13</i>	
		<i>Già vaccinati con PPV 23</i>	<i>PCV 13</i>	<i>Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23</i>