

Dosaggi giornalieri nel Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging) Legge 648/96

Tabella A. Dosaggio giornaliero per via sottocutanea di EBPM per pazienti con rischio basso e moderato di tromboembolismo

EBPM	Dosaggio giornaliero
Nadroparina	2850 - 3800 - 5700 UI die
Enoxaparina	4000 UI die
Reviparina	1750 - 4200 UI die
Dalteparina	5000 UI die
Bemiparina	3500 UI die
Parnaparina	4250 UI die

Tabella B. Dosaggio giornaliero per via sottocutanea di EBPM per pazienti con rischio alto di tromboembolismo (dosi intorno al 70% di quelle terapeutiche)

Dosaggio giornaliero per peso corporeo	Nadroparina	Enoxaparina	Dalteparina	Reviparina	Parnaparina	Bemiparina
< 50 Kg	2850 UI x 2 die	2000 UI x 2 die	3200 UI x 2 die	3500 UI die
50-69 Kg	3800 UI x 2 die	4000 UI x 2 die	7500 UI die	4200 UI x 2 die	4250 UI x 2 die
70-89 Kg	5700 UI x 2 die	6000 UI x 2 die	10000 UI die	6400 UI x 2 die
90-110 Kg	7600 UI x 2 die	8000 UI x 2 die	12500 UI die	6300 UI x 2 die	7500 UI die
> 110 Kg	9500 UI x 2 die	10000 UI x 2 die	15000 UI die	6300 UI x 2 die