

## Utilizzo dei vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente Original/OmicronBA.1 nell'ambito campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19

(Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1)

è utilizzabile solo come **DOSE DI RICHIAMO**  
ed è raccomandata prioritariamente come:

- **prima dose di richiamo** a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario
- **seconda dose di richiamo** a tutti i soggetti che sono in attesa della seconda dose di richiamo includendo
  - persone con più di 60 anni,
  - operatori sanitari, operatori e ospiti strutture residenziali,
  - donne in gravidanza,
  - persone a partire dai 12 anni in su in condizioni di elevata fragilità per patologie concomitanti/pre-esistenti (vedi allegato 2 Circolare 11 luglio 2022)

## Utilizzo dei vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente Original/OmicronBA.1 nell'ambito campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19

**Per la seconda dose di richiamo devono essere passati almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dalla malattia**

**La malattia da COVID 19 è considerata equivalente ad una dose di vaccino**

**Al momento, pur non essendo controindicata non è raccomandabile effettuare la 5 dose, salvo diversa indicazione ministeriale**

## Raccomandazioni Generali :



Il vaccino si presenta come un flaconcino multidose con capsula di chiusura grigia

Non diluire prima dell'uso

Ogni flaconcino (2,25 mL) contiene **6 dosi** da 0,3 mL

Il flaconcino può essere utilizzato fino ad un massimo di **12 ore** dalla prima perforazione



Far firmare il consenso informato prima della somministrazione del vaccino