

CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, potrà essere rilasciata in formato cartaceo con validità fino al 30 settembre 2021

MODALITA' DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

- Rilasciate direttamente dai medici vaccinatori delle ASL ed enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;
- Le certificazioni dovranno contenere:
 - -dati identificativi del soggetto
 - -dicitura "soggetto esente dalla vaccinazione"
- Deve essere indicata la validità della certificazione con la dicitura "certificazione valida fino al _____"
- Denominazione del servizio-regione
- Timbro e firma del medico certificatore

PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

- Condizioni nel ricevente che aumentano il rischio di gravi reazioni avverse o compromettono la capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria.
- **REAZIONE ALLERGICA GRAVE DOPO PRIMA DOSE:** costituisce controindicazione nella somministrazione di ulteriori dosi;
 - **GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO:** vaccinazione non controindicata ma rimandabile;
 - **SINDROME GUILLAIN-BARRE':** insorta entro 6 settimane dalla vaccinazione anti covid-19, costituisce controindicazione nella somministrazione di ulteriori dosi;
 - **MIOCARDITE/PERICARDITE:** necessaria valutazione delle condizioni cliniche del paziente;
 - **TEST SIEROLOGICO:** non raccomandato ai fini del processo decisionale vaccinale.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DEI VACCINI ATTUALMENTE UTILIZZATI IN ITALIA

- **COMIRNATY (Pfizer-Biontech):** ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- **SPIKEVAX (Moderna):** ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- **VAXVEVRIA (Astrazeneca):** ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; -soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxvevria; -soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi da perdita capillare;
- **JANSSEN (J&J):** ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.

PER I CASI DUBBI E FINO A QUANDO LA REGIONE NON DARA' SPECIFICHE DIRETTIVE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE, SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE VISITA SPECIALISTICA CON QUESITO DIAGNOSTICO SPECIFICO PER LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19