

ASLBA

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
Lung. Starita, 6 – 70123 Bari – Codice fiscale / partita IVA 06534340721
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
080 5842442

Prot. n° 89068/1009 - 81258 del _____
Allegati : 1) modello richiesta vaccini

20 MAG. 2013

Oggetto: Organizzazione Campagna di Vaccinazione Antipneumococcica nell'adulto e nell'anziano.
Comunicazioni e direttive.

Al
Dr. Francesco NARDULLI
S.I.S.P. ex ASL BA/4
BARI

Dr. Giovannantonio DADDABBO
S.I.S.P. ex ASL BA/5
PUTIGNANO

Dr. Pasquale DRAGO
U.O. S.I.S.P. ex ASL BA/2
BITONTO

Dr. Antonino MADARO
U.O. S.I.S.P. Distretto 2 ex ASL BA/3
ACQUAVIVA delle FONTI

Dr. Francesco MIALE
U.O. S.I.S.P. Distretto 1 ex ASL BA/3
ALTAMURA

Ai Medici della Centro Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni

ASL BARI
LORO SEDI

Lo *Streptococcus pneumoniae* è tra le principali cause di complicanze polmonari che richiedono nel 30-50% dei casi l'ospedalizzazione con tassi di mortalità particolarmente elevati tra gli anziani e gli adulti a rischio di complicanze. L'incidenza della patologia invasiva da pneumococco (IDP) negli adulti aumenta con l'avanzare dell'età. I sierotipi pneumococcici presenti in PCV 13 possono essere responsabili per almeno il 50-76% delle IPD negli adulti di età di 50 anni e oltre.

Nel settembre 2011, l'EMA aveva espresso parere favorevole alla modifica del RCP del vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente (PCV13) con l'indicazione: "Immunizzazione attiva per la prevenzione di patologia invasiva, causata da *Streptococcus Pneumoniae* in adulti di 50 anni di età ed oltre".

Nell'ottobre 2011 è stata autorizzata la revisione del RCP con l'indicazione alla somministrazione di una dose singola. I trial clinici hanno dimostrato che l'immunogenicità del vaccino coniugato 13 valente è significativamente superiore a

Nell'ottobre 2011 è stata autorizzata la revisione del RCP con l'indicazione alla somministrazione di una dose singola. I trial clinici hanno dimostrato che l'immunogenicità del vaccino coniugato 13 valente è significativamente superiore a quella del PPV 23 per la maggior parte dei sierotipi presenti in entrambi i vaccini. Il PCV 13, essendo coniugato induce una risposta T-dipendente con produzione di IgG a maggior affinità e risposta immunologia, sia nei confronti di un richiamo con PCV 13 che di una successiva vaccinazione con PPV 23.

La Commissione Tecnico Scientifico Vaccini della Regione Puglia, nota Assessorile prot. AOO152 / n.3731 del 13.03.2012 ,all. n 1, ha modificato le indicazioni per la somministrazione della vaccinazione antipneumococcica nell'adulto. Lo stesso "Calendario Vaccinale per la Vita " di marzo 2012 ,iniziativa condivisa a livello nazionale della Fimmg ,dalla Fimp,dalla Società Italiana di Pediatria e dalla Società di Igiene (Siti) ha proposto –sulla base delle migliori evidenze scientifiche – di vaccinare estesamente contro la malattia pneumococcica .

Alla luce delle indicazioni regionali (DRG 241/13 del 18.02.2013) "Calendario Vaccinale per la vita 2012 " - Regione Puglia - e sulla scorta di numerosi trial clinici, questa Azienda Sanitaria Locale di Bari intende avviare l'organizzazione della campagna di vaccinazione antipneumococcica utilizzando il vaccino coniugato 13-valente(PCV 13) e il vaccino polisaccaridico 23-valente (PPV 23), secondo un modello di programmazione incrementale nel corso degli anni per ciò che concerne l'individuazione sia delle coorti target che dei relativi obiettivi di copertura vaccinale.

Tale strategia mira a coprire nell'arco di 5 anni i soggetti nella fascia di età 65-80 anni. L'obiettivo è quello di raggiungere livelli di copertura vaccinale del 70% tra i candidati alla vaccinazione.

Una novità importante nella strategia di vaccinazione, consiste nel superamento della stagionalità dell'offerta della vaccinazione anti-pneumococcica, utilizzando la campagna antinfluenzale solo come ulteriore occasione opportuna.

La campagna sarà condotta in collaborazione con i **Medici di Medicina Generale**.

L'avvio della suddetta campagna antipneumococcica è prevista per il c.a. dal mese di Maggio .

L'impegno e la collaborazione dei MMG risulta fondamentale per assicurare una maggiore appropriatezza nell'erogazione dei servizi di prevenzione in un contesto di sinergie operative e razionalizzazione della spesa sanitaria.

Anche per la campagna anti-pneumococcica in questione ,questa ASL confida ,nell'impegno e nella collaborazione dei MMG per fornire una risposta sempre più efficiente ed efficace del SSN alla domanda di prevenzione espressa dalla popolazione attraverso la vaccinazione contro lo pneumococco.

La campagna vaccinale per l'anno 2013 prevede l'offerta **attiva e gratuita** :

1 – ai soggetti appartenenti alla tre coorti di nascita dei 65enni, dei 70enni e dei 75 enni ,e cioè dei soggetti nati rispettivamente nel 1948, nel 1943 e nel 1938 in poi ;

2 - a tutti i soggetti over 75;

3 - ai soggetti adulti di 50 anni di età e oltre,non compresi nelle coorti individuate nei punti 1 e 2, a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza di patologie e condizioni predisponenti quali:

- o cardiopatie croniche
- o malattie polmonari croniche
- o cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcolismo
- o diabete mellito,in particolare se in difficile compenso
- o fistole liquorali
- o anemia falciforme e talassemia
- o immunodeficienza congenite e acquisite
- o asplenia anatomica o funzionale
- o leucemia,linfomi,mielomi multiplo
- o neoplasie diffuse
- o trapianto d'organo o di midollo,
- o immunosoppressione iatrogeno clinicamente significativa
- o insufficienza renale cronica,sindrome nefrosica
- o HIV positivi
- o portatori di impianto cocleare

Si precisa che per ciò che riguarda la somministrazione del PCV 13 ai soggetti di compresa tra i 18 e 49 anni si è in attesa di registrazione in scheda tecnica delle indicazioni terapeutiche.

L'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-pneumococcica dovrà avvenire secondo il seguente schema :
tabella 1

Età in anni	Classe	Stato vaccinale	Vaccino	Note
≥ 50 a rischio	≤ 1963	non vaccinati vaccinati	PCV 13 PCV 13	da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
65	1948	non vaccinati vaccinati per patologia	PCV 13 PCV 13	da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
70	1943	non vaccinati vaccinati per patologia	PCV 13 PCV 13	da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
≥ 75	≤ 1938	non vaccinati vaccinati da 5 anni con PPV 23	PPV 23 PPV 23	N.B. da utilizzare come richiamo ogni 5 anni

Ai soggetti di età ≥ 50 a rischio di contrarre la malattia pneumococcica dovrà essere somministrato il vaccino coniugato 13-valente (PCV 13).

Il vaccino 23-valente sarà utilizzato per i soggetti di età ≥ 75 anni (Tabella 1).

Per i soggetti appartenenti alle coorti target non vaccinati è consigliato iniziare il ciclo con PCV 13; mentre ai soggetti vaccinati con PPV 23 (o con storia vaccinale non nota) si raccomanda la somministrazione del PCV 13 dopo almeno 1 anno.

E' previsto per il c.a. Il recupero di tutti i soggetti non vaccinati per età previste nella campagna vaccinale dello scorso anno secondo il seguente schema :

Classe	Stato vaccinale	Vaccino	Note
1947	non vaccinati vaccinati per patologia	PCV 13 PCV 13	da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
1942	non vaccinati vaccinati per patologia	PCV 13 PCV 13	da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
1937 in poi	non vaccinati già vaccinati con PPV23	PPV 23 PPV 23	Da utilizzare come richiamo ogni 5 anni

Da Maggio **2013** i vaccini saranno disponibili presso le sedi delle Unità Operative S.I.S.P. territoriali del Dipartimento di Prevenzione.

Pertanto per l'approvvigionamento delle dosi il MMG, valutato il proprio fabbisogno, prenderà contatto per con il referente individuato nell'Unità Operativa S. I. S. P. del suo territorio per inoltrare la richiesta delle dosi (anche per via fax o e. mail) e concordare i tempi, le modalità della consegna.

Pertanto si invitano i Responsabili SISIP in indirizzo ad individuare:

- 1) il referente Medico dell'Unità Operativa SISIP, con i relativi recapiti (indirizzo sede, telefono/fax o indirizzo e.mail), responsabile del processo organizzativo della campagna vaccinale e della distribuzione del vaccino PCV 13 ai MMG;
- 2) le sedi vaccinali per la consegna del vaccino
e trasmettere quanto richiesto a questo Dipartimento, con cortese urgenza, entro e non oltre il **9.05.2013**.

Il MMG dovrà assicurare la corretta gestione per il mantenimento della catena del freddo per il trasporto e la conservazione dei vaccini.

Si sottolinea che ogni Medico di Medicina Generale è tenuto alla registrazione informatica dei dati relativi ai soggetti vaccinati.

Tale registrazione informatizzata si rende necessaria per la valutazione di eventuali eventi avversi e per la sorveglianza epidemiologica della patologia e delle eventuali complicanze nonché per facilitare le rendicontazioni nei riguardi dei MMG vaccinatori.

Gli UDMG dei vari Distretti provvederanno ad assicurare il regolare flusso informativo nei confronti del Dipartimento di Prevenzione per competenze in materia di valutazione dei livelli di copertura vaccinale ed epidemiologici.


Per la parte amministrativa, il responsabile dell'UDMG unitamente al referente amministrativo distrettuale verificata la corretta trasmissione dei dati predisporrà l'elenco dei MMG ai quali il Distretto riconoscerà l'indennità economiche spettanti.

Verranno a breve comunicate ulteriori direttive riguardanti la tempistica dei report relativi alla copertura vaccinale della precitata campagna.

Si raccomanda ai MMG, nella richiesta delle dosi, di rispettare la **selezione delle coorti target** e i livelli di copertura attesi, al fine di evitare possibili giacenze di **dosi inutilizzate** ed assicurare il corretto svolgimento della Campagna Vaccinale. Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento dei costi e nel comune interesse della tutela della salute della popolazione, si auspica il raggiungimento degli obiettivi.

Si invita le SS.LL alla diffusione della stessa a tutto il personale di Igiene Pubblica e dei Centri vaccinali di vostra competenza territoriale.

Il Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASL BA
Dr. Domenico Lagravinese



Cordiali saluti

(laforgia tel 080584232)

ASLBA

Alla Azienda ASL di BARI

Dipartimento di Prevenzione ASL BA

SEDE di _____

Il sottoscritto Medico di Medicina Generale

Dott./Dott.ssa _____

N° codice regionale _____

Tel. _____

Richiede contestualmente :

a) La fornitura di :

n. _____ dosi di vaccino pneumococcico coniugato 13 valente :

b) n. _____ dosi di vaccino pneumococcico polissacaridico 23 valente :

Dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici per il mantenimento della catena del freddo per la conservazione dei vaccini .

DATA . _____

Firma del Medico